

ボツラックス注射 治療同意書

ボツラックスとは、ボツリヌス菌から抽出されたタンパク質の一種で、A型ボツリヌス毒素を有効成分とする筋弛緩剤です。

表情筋の過剰な働きを抑え、しわなどお顔のお悩みを改善していきます。また発汗を抑えることができたり、多様な用途があります。

当院では、KFDA(韓国食品医薬品安全庁)に医薬承認されており、効果と安全性を認められている韓国ヒューゲル社のボツリヌストキシン製剤を使用します。

筋肉の形や大きさ、配置には少なからず個人差があるため、同じように注射しても必ず同じ結果となるわけではありません。

個人差を考えて施術する必要があり、オーダーメイドで施術します。何回か治療をして経過を診ている患者様であれば個人差を考えて施術できますが初回治療の患者様は傾向がわからないため、標準的な治療を施して反応を診させて頂いております。

当院での標準的な治療は、完全には表情じわを止めないようにマイルドに効かせます。ナチュラルな表情のまましわを改善できます。

【治療前の注意事項】

- ・治療当日の体調、お使いいただいているお薬によっては注射をお断りする場合があります。
- ・他院を含め、3ヶ月以内に美容治療を受けた方は必ずお申し出ください。受けられた施術の内容、時期によっては注射をお断りする場合があります。
- ・ケロイド体质の方、全身性の筋肉の脱力などの病気、喘息、緑内障、糖尿病、血液をサラサラにする薬を内服中の方は施術できません。
- ・施術部位に肌荒れや炎症がある方は施術できません。
- ・結婚式など大切なイベントを2ヶ月以内に控えた方は施術できません。
- ・女性は、投与中と投与終了後2回の月経を経るまで避妊するようにしてください。妊娠中またはその可能性のある方、授乳中の方は施術できません。
- ・男性は、ボツラックスの投与中および最終投与後の少なくとも3ヶ月は避妊するようにしてください。
- ・感染症のある方及び感染症の治療を受けている方の施術はできません。
- ・過去にボツリヌス毒素注入でアレルギーなどのトラブルが起こったことがある方、これまでにボツラックスへのアレルギーを指摘されたことのある方は、施術を受けることができません。他の薬剤などでアレルギーのある方は医師により施術が可能かを判断させていただきますので、必ずカウンセリングの際にその旨をお伝えください。
- ・治療後に全身の倦怠感、脱力感を感じられることがあります。これは、ボツリヌストキシンの筋肉をゆるめる作用が、注入した局部だけでなく、全身の筋肉に作用してしまっている状態です。通常は数時間で改善し、長く続くことはありません。
- ・ボツリヌス製剤の影響により赤味や内出血、突っ張った感じがすることがあります。また、部位によっては違和感があつたり、硬いものが噛みにくくなったりします。いずれの場合も、数日から数週間で改善していきます。
- ・麻酔を希望する場合は別途費用が掛かります。

【治療中の注意点】

- ・注射の針を入れる時に、チクッとした軽い痛みを感じることがあります。
- ・まれにアレルギー、しづれ、倦怠感、頭痛、筋肉痛、尋麻疹、かゆみ、むくみ、発熱、冷や汗、胸痛、アナフィラキシーショックなどを生じることがあります。

【治療後の注意点】

- ・注射当日の洗顔は問題ありませんが、注射部位を揉んだり強くこすったりしないでください。
- ・薬剤を注射した部位がはねぼつた感じや、眉毛が上がったり下がったりした感じ、眼の周囲の腫れ、まぶたが重くかぶさった感じ、一時的な表情の変化、額が締め付けられるような頭痛を感じることがあります。このような症状には個人差がありますが、数日から数週間で消失してきますので安心ください。
- ・施術後多少赤みや腫れが残りますが、通常1~2日で落ち着きます。まれに腫れが強く出たり、内出血を起こしたりすることがあり、その場合目立たなくなるまで1~3週間かかることがあります。
- ・ボツラックスの効果ができるまでは、注射後数2週間~1ヶ月間かかります。ボツラックスの効きかたには個人差があります。
追加注入を希望の方は通常料金にて施術2週間後より施術できます。
- ・脱力感、筋力低下、めまい、視力低下が現れることがあるため、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作はご注意ください。
- ・まれに眼瞼挙筋(マブタをあける筋肉)に効いて目が開きづらくなる場合がございます。
- ・ボツラックスの効果は3~6ヶ月ですが、実際には個人差があります。
- ・ボツラックスは繰り返し注射が可能ですが、繰り返すうちにまれに耐性を生じ、効果が出なくなることがあります。

【副作用】

- ・治療により注射部位及び周囲の疼痛、発赤、皮下出血斑、腫脹、熱感、色素沈着、感染症、神経損傷、血管迷走神経反射、眼瞼下垂、アレルギー反応、注射部疼痛、左右差、無表情、内出血等の症状が起こる場合があります。
- ・体质などにより、アレルギーやアナフィラキシーショックが生じた際は、緊急処置を行います。しかし、専門的な検査・治療をする際の移送やそこでの検査・治療などに関わる一切の費用に関して当院は責任を負いません。
- ・本医薬品がヒト(又は動物)に由来する成分を含む医薬品であり、クロイツフェルト・ヤコブ病等、未知の疾患に罹患する恐れがあります。
- ・治療には副作用が発症する可能性があることもご理解いただいた上でお受けください。
- ・治療効果がご期待に添えない場合や副作用が発症した場合でも治療費の返還はありません。
また、副作用に関わる治療費は患者様ご本人のご負担になりますことをご了承ください。

【治療回数・間隔】

- ・患者さまの状況によってどれくらいのサイクルで治療するかを決めていきます。目安としては、3~6ヶ月に1回の頻度で続ける事をお勧めします。

【ご予約・キャンセルについて】

- ・定期的な来院が必要な治療です。ご予約は早めにお願いします。
- ・予約日時の24時間前までに(休診日・休診時間を除く)お電話にて変更またはキャンセルのご連絡がない場合、2,000円のキャンセル料を頂いておりますのでご了承ください。

以上の内容を十分に理解しましたので、治療を受けることに同意いたします。