

赤み取りレーザー治療 同意書

ロングパルスヤグレーザーの照射により、肌の深部にある赤みの原因にアプローチする治療です。
皮膚の深部まで届く色素レーザーにより、血液中のヘモグロビンや異常のある毛細血管に反応し、破壊できるため
血管腫や毛細血管拡張、赤ら顔などの改善が期待できます。

【施術前の注意事項】

- ・施術前、メイクはしっかり落としてください。
- ・日焼け直後、開いた傷など、大きな黒子がある場合は施術できません。※施術当日のお肌の状態によっては照射をお断りする場合があります。
- ・妊娠中、授乳中の方はご注意ください。母体や胎児に影響を与える事例はありませんが、ホルモンバランスの変化によりお肌が過敏になり肌荒れを起こしやすくなるなどお身体の変調を考慮し、施術はできません。
- ・お使いいただいているお薬によっては、当日施術ができない場合があります。
- ・他院を含め、1か月以内に美容治療を受けた方は必ずお申し出ください。受けられた施術の内容、時期によっては施術をお断りする場合があります。
- ・ピーリング剤やトレチノイン、ディフェリンを使用している方は、お肌の状態により照射ができない場合があります。
- 施術後の再開は、刺激症状が消失し、かつ施術から1週間が経過してからお願ひいたします。
- ・治療及び施術内容、部位、お肌の状態によって施術前及び施術後に写真撮影させていただくこともございます。個人情報保護の観点からWEBの搭載や第三者への開示はいたしませんのでご安心ください。当院にて厳重に管理いたします。

【施術中の注意点】

- ・レーザー照射中は、多少チクチクする痛みがあります。部位によっては(骨の出ている部分など)痛みが増すことがあります。
パワーの調節などもできますので、医師にご相談ください。

【施術後の注意点】

- ・シャワー、入浴は当日から可能ですが、熱いお湯に長時間入ることは避けてください。
- ・肌や体質など個人差によって2~3日ほど赤みやほてり、ヒリヒリとした痛みを感じる場合や、稀にやけど、水ぶくれになる場合があります。
強い赤みや腫れなどが続く場合は、必要な処置を行いますので、速やかにご連絡いただけますようお願ひいたします。
- ・治療には副作用が発生する可能性があることをご理解の上で、受けていただけますようお願ひいたします。
- ・治療効果が期待に添えない場合や副作用が発生した場合でも、治療費の返還はありません。
また、副作用に関する治療費は患者様ご本人のご負担となりますので、予めご了承ください。

【副作用】

- ・照射後、赤み、腫れ、ひりひり感、軽い内出血のような症状が生じる場合があります。赤みは数時間~数日、他の症状は数日~数週間で自然におさまります。
- ・施術により強い発赤、腫れ、水泡などが生じた場合、その他の副作用または合併症が生じた場合は必要な処置を行いますので、当院の指示に従ってください。お早目にご連絡をお願いいたします。
- ・上記のような症状の発現には個人差があり、時間が経ってから症状が現れることがあります。
- ・治療には副作用が発症する可能性があることもご理解いただいた上でお受けください。
- ・治療効果がご期待に添えない場合や副作用が発症した場合でも治療費の返還はありません。また、副作用に関する治療費は患者様ご本人のご負担になりますことをご了承ください。

【施術回数】

- ・1回の治療で完全に消えることは少なく、複数回の治療で徐々に改善します。3~5回程度で効果を実感する人が多く、症状が強い場合は5~10回程度になることもあります。
- ・治療部位の大きさ、範囲により違いはありますが、おおよその治療時間は5~15分程度です。
- ・原則として治療部位の発赤が取れるまでの期間は同部位の再治療はできません。

【ご予約・キャンセルについて】

- ・予約日時の24時間前までに(休診日・休診時間を除く)お電話にて変更またはキャンセルのご連絡がない場合、2,000円のキャンセル料をいただいておりますのでご了承ください。

以上の内容を十分に理解しましたので、施術を受けることに同意いたします。